

# FORTGESCHRITTENES PROSTATAKARZINOM

---

Informationen zu Ihrer Therapie  
mit ERLEADA® 240 mg

**PATIENTEN-  
INFORMATION**  
nur nach Verordnung  
von ERLEADA® 240 mg  
abzugeben

Janssen-Cilag GmbH  
[www.janssen.com/germany](http://www.janssen.com/germany)

janssen  Oncology

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF *Johnson & Johnson*

# Einführung

## LIEBER PATIENT,

Ihre Ärztin/Ihr Arzt hat Ihnen Apalutamid (ERLEADA®) 240 mg zur Behandlung Ihres metastasierten hormonsensitiven Prostatakarzinoms (mHSPC) oder nicht-metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinoms (MOCRPC) verschrieben.\*

**Das bedeutet, dass Sie jeden Tag eine ERLEADA® 240 mg Filmpille einnehmen werden.** Nehmen Sie **NICHT** mehr als eine Tablette ERLEADA® 240 mg pro Tag ein.

Während Sie sich an die Einnahme von ERLEADA® 240 mg gewöhnen, bewahren Sie diese Patienteninformation gut sichtbar oder gemeinsam mit Ihrem Arzneimittel auf. Geben Sie diese Informationen unbedingt an alle Personen weiter, die Ihnen bei der Einnahme des Arzneimittels helfen.

**Bitte beachten Sie die weiteren Informationen der aktuellen Gebrauchsinformation.**

Die hier enthaltenen Informationen ersetzen keinesfalls das Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt. Wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder eine medizinische Einrichtung (Arztpraxis oder Krankenhaus), wenn Sie Fragen haben.

Die Gebrauchsinformation ist auch online verfügbar unter:



Scannen Sie den QR-Code  
<https://www.janssenmedicalcloud.de/de-de/fach-und-gebrauchsinformationen>

\* In Kombination mit Androgendeprivationstherapie (ADT).

# ERLEADA® 240 mg Tablette

E240

### Wie sieht die Tablette aus?

- Blaugrau bis grau, oval
- E240 auf einer Seite eingraviert

### Wie ist die tägliche Dosierung?

- 1 Tablette pro Tag

### Wie wird die Tablette eingenommen?

- Einmal täglich, entweder mit dem Essen oder zwischen den Mahlzeiten
- Zerdrücken oder teilen Sie die Tablette nicht

## Einnahme ERLEADA® 240 mg

**Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, die ERLEADA® 240 mg Tablette einzunehmen.**

### ENTWEDER:

1



**Schlucken Sie die Tablette im Ganzen mit einem Glas Wasser,** um sicherzustellen, dass die volle Dosis eingenommen wird.  
**Zerdrücken oder teilen Sie die Tablette nicht.**

### ODER:

2

1. Geben Sie die ERLEADA® 240 mg Tablette in ein Glas. **Zerdrücken oder teilen Sie die Tablette nicht.**
2. **Fügen Sie etwa zwei Teelöffel (10 ml) stilles Wasser hinzu,** um die Tablette vollständig zu bedecken. **Warten Sie zwei Minuten,** bis die Tablette aufgelöst ist und sich verteilt hat, und rühren Sie die Mischung dann um.
3. Geben Sie sechs Teelöffel (zwei Esslöffel oder 30 ml) eines der folgenden Getränke oder weichen Nahrungsmittel dazu:



Stilles Wasser



Orangensaft



Apfelsaft



Trinkjoghurt

4. **Verrühren** Sie die Mischung und **schlucken** Sie sie anschließend **umgehend.**
5. **Geben Sie danach etwas stilles Wasser in das Glas,** um sicherzustellen, dass die gesamte Dosis eingenommen wird. **Trinken Sie das Wasser sofort.**
6. **Bewahren Sie nichts von der Mischung für eine spätere Verwendung auf.**

Wenn Sie mehr ERLEADA® eingenommen haben als verordnet, wenden Sie sich sofort an Ihre Ärztin/Ihren Arzt.

Alle im Bereich dieses Dokuments zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Die Janssen-Cilag GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Für den Ersatz von Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, haftet die Janssen-Cilag GmbH nur, wenn ihr, ihren gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Diese Einschränkung der Haftung auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten gilt nicht für Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

V1.0, Stand: September 2023